ETUDE D'UNE FONCTION RATIONNELLE

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{2(1-x)}$ et on note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f
- 2) Démontrer que le point $\Omega\left(1; \frac{5}{2}\right)$ est centre de symétrie de la courbe
- 3) Calculer $f'(x)$
- 4) En déduire les variations de f et préciser les asymptotes horizontales et/ou verticales, les tangentes horizontales et les extremums. Dresser le tableau de variations de f

CORRECTION

1) La division par $1-x$ implique $1-x \neq 0$ donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$

2) On calcule, pour

on calcule $f(2x-1)+f(x)$ on trouve que cette quantité est égale à

$5=2x(5/2)$ donc on déduit le résultat demandé

Ceci prouve que le point $\Omega\left(1; \frac{5}{2}\right)$ est centre de symétrie de la courbe

3) f est dérivable sur chacun des intervalles de D_f , en tant que quotient de fonctions qui le sont, et puisque f est de la forme $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, où $u(x) = x^2 - 7x + 10 \Rightarrow u'(x) = 2x - 7$ et $v(x) = 2(1-x) \Rightarrow v'(x) = -2$, on en déduit que pour tout

$$x \in]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[, f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{(2x-7) \times 2(1-x) - (x^2 - 7x + 10) \times (-2)}{(2(1-x))^2}$$

$$= \frac{4x - 4x^2 - 14 + 14x + 2x^2 - 14x + 20}{4(1-x)^2} = \frac{-2x^2 + 4x + 6}{4(1-x)^2} = \frac{2(-x^2 + 2x + 3)}{4(1-x)^2} = \frac{-x^2 + 2x + 3}{2(1-x)^2}$$

4) Puisque pour tout $x \in]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[, 2(1-x)^2 > 0$, $f'(x)$ sera du même signe que $P(x) = -x^2 + 2x + 3$. Le calcul du discriminant de P donne $\Delta = (2)^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 16 > 0$ donc P admet deux racines réelles distinctes $\alpha = \frac{-2 - \sqrt{16}}{-2} = 3$ et $\beta = \frac{-2 + \sqrt{16}}{-2} = -1$, d'où $P(x) = -(x-\alpha)(x-\beta) = -(x+1)(x-3)$, d'où le tableau de signes de $P(x)$ donc de $f'(x)$:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$P(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0
		$+$		$-$	

On en déduit que f est strictement décroissante sur $x \in]-\infty; -1]$ et sur $[3; +\infty[$, et strictement croissante sur $[-1; 1[$ et sur $]1; 3]$. Elle atteint donc deux extremums locaux en $x = -1$ et $x = 3$, qui valent respectivement $f(-1) = 4,5$ et $f(3) = 0,5$. Aux points d'abscisses -1 et 3 , C admet une tangente horizontale.

La limite en $\pm\infty$ d'une fraction rationnelle étant celle du quotient simplifié de ses numérateur et dénominateur, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{x}{2} = -\infty \text{ et de même } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{x}{2} = +\infty$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 7x + 10 = 4$. Comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} 2(1-x) = 0^-$ (car $x > 1 \Leftrightarrow 1-x < 0$), on en déduit, par quotient, que

$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = -\infty$. De même, puisque $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} 2(1-x) = 0^+$, on en déduit que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = +\infty$. La droite d'équation $x = 1$

est asymptote à la courbe (C)

Résumons cela dans le tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ $4,5$			$-\infty$ $0,5$ $-\infty$	