Serie1

On considère les deux courbes (C_1) et (C_2) d'équations respectives $y = e^x$ et $y = -x^2 - 1$ dans un repère orthogonal du plan. Le but de cet exercice est de prouver qu'il existe une unique tangente (T) commune à ces deux courbes.

1. Sur le graphique représenté ci-dessous, tracer approximativement une telle tangente à l'aide d'une règle. Lire graphiquement l'abscisse du point de contact de cette tangente avec la courbe (C_1) et l'abscisse du point de contact de cette tangente avec la courbe (C_2) .

2. On désigne par a et b deux réels quelconques, par A le point d'abscisse a de la courbe (C_1) et par B le point d'abscisse b de la courbe (C_2) .

a) Déterminer une équation de la tangente (T_A) à la courbe (C_1) au point A .

b) Déterminer une équation de la tangente (T_B) à la courbe (C_2) au point B .

c) En déduire que les droites (T_A) et (T_B) sont confondues si et seulement si les réels a et b sont solutions du système (S) :

$$\begin{cases} e^a = -2b \\ e^a - a e^a = b^2 - 1 \end{cases}$$

d) Montrer que le système (S) est équivalent au système (S') $\begin{cases} e^a = -2b \\ e^{2a} + 4a e^a - 4e^a - 4 = 0 \end{cases}$.

3. Le but de cette question est de prouver qu'il existe un unique réel solution de l'équation (E) $e^{2x} + 4x e^x - 4e^x - 4 = 0$

Pour cela, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{2x} + 4x e^x - 4e^x - 4$

a) Montrer que pour tout x appartenant à $] -\infty ; 0 [$, $e^{2x} - 4 < 0$ et $4e^x(x-1) < 0$

b) En déduire que l'équation (E) n'a pas de solution dans l'intervalle $] -\infty ; 0 [$.

c) Démontrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[0 ; +\infty [$.

d) Démontrer que l'équation (E) admet une solution unique, dans l'intervalle $[0 ; +\infty [$. On note α cette solution. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .

4. On prend pour A le point d'abscisse α . Déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-1} du réel b pour lequel les droites (T_A) et (T_B) sont confondues.

Correction

1.

l'abscisse du point de contact de la tangente avec la courbe (C_1) est approximativement 0,9

l'abscisse du point de contact de la tangente avec la courbe (C_2) est approximativement $-1,2$.

2. a) La tangente à la courbe (C_1) au point A est la droite de coefficient directeur $f'(a) = e^a$ passant par A $(a; e^a)$ donc une équation de la tangente (T_A) à la courbe (C_1) au point A est $y = e^a(x - a) + e^a$

b) La tangente à la courbe (C_2) au point B est la droite de coefficient directeur $g'(b) = -2b$ passant par B $(b; -b^2 - 1)$

Une équation de la tangente (T_B) à la courbe (C_2) au point B est $y = -2bx + b^2 - 1$

c) Les droites (T_A) et (T_B) sont confondues si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux donc $e^a = -2b$ et leurs ordonnées à l'origine sont égales soit : $-ae^a + e^a = b^2 - 1$

Les réels a et b sont solutions du système (S) :

$$\begin{cases} e^a = -2b \\ e^a - ae^a = b^2 - 1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} e^a = -2b \\ e^a - ae^a = b^2 - 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2b = -e^a \\ 4e^a - 4ae^a = 4b^2 - 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^a = -2b \\ 4e^a - 4ae^a = 4(e^a)^2 - 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^a = -2b \\ 4e^a - 4ae^a = 4e^{2a} - 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^a = -2b \\ e^{2a} + 4ae^a - 4e^a - 4 = 0 \end{cases}$$

3. a) pour tout x appartenant à $]-\infty; 0[$, $2x \leq 0$ donc $e^{2x} \leq e^0$ soit $e^{2x} \leq 1$ donc $e^{2x} - 4 \leq -3 < 0$

pour tout x appartenant à $]-\infty; 0[$, $4 > 0$; $e^x > 0$ et $(x - 1) < 0$ donc $4e^x(x - 1) < 0$

b) $e^{2x} + 4xe^x - 4e^x - 4 = e^{2x} - 4 + 4e^x(x - 1)$

La somme de deux nombres strictement négatifs est un nombre strictement négatif donc pour tout x appartenant à $]-\infty; 0[$, $f(x) < 0$
L'équation (E) n'a pas de solution dans l'intervalle $]-\infty; 0[$.

c) $f'(x) = 2e^{2x} + 4(e^x + xe^x) - 4e^x$ donc $f'(x) = 2e^{2x} + 4xe^x = 2(x + 2)e^x$

La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, $x \geq 0$ donc $x + 2 > 0$ et $f'(x) > 0$

la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - 4 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4e^x = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$f(0) = -7$

f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$, (somme de fonctions continues sur $\mathbb{R}$) strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

$f([0; +\infty[) = [-7; +\infty[$

$0 \in [-7; +\infty[$ donc l'équation (E) $f(x) = 0$ admet une solution unique, dans l'intervalle $[0; +\infty[$.

$f(0,84) \approx -0,117$ et $f(0,85) \approx 0,07$ donc $f(0,84) < 0$ et $f(0,85) > 0$ donc $0,84 \leq \alpha \leq 0,85$.

4. $b = -\frac{1}{2}e^a$ or $0,84 \leq a \leq 0,85$ donc $e^{0,84} \leq e^a \leq e^{0,85}$ donc $-\frac{1}{2}e^{0,85} \leq -\frac{1}{2}e^a \leq -\frac{1}{2}e^{0,84}$

soit $-1,2 \leq -\frac{1}{2}e^{0,85} \leq b \leq -\frac{1}{2}e^{0,84} \leq -1,1$